

# 定期予防接種の標準的な受けかた(接種スケジュール参考例)

深谷市

年齢(月齢)		生後6週	2か月	3か月	6か月	7か月	9か月	10か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳
ワクチン	ロタリックス		☺	☺												
	ロタテック		☺	☺	☺											
B型肝炎			Hib	Hib												
小児用肺炎球菌			Hib	Hib	Hib											
5種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)			Hib	Hib	Hib											
BCG						Hib										
麻しん風しん混合(MR)										Hib						
水痘(みずぼうそう)										Hib						
日本脳炎																

経口(飲む)ワクチンです。  
ロタリックスは出生24週0日までに2回、  
ロタテックは出生32週0日までに3回完了しましょう。

1回目から139日以上の間隔(20週後の  
同じ曜日以降)をおいて接種

生後2か月を過ぎたら早めに接種しましょう。  
(B型肝炎、小児用肺炎球菌、5種混合)

初回3回目の接種後、60日以上の間隔をおい  
て生後12か月から15か月に至るまで1回接種

接種開始年齢に応じて、接種回数や接種間隔が異なります。  
詳細は、同封の冊子「予防接種と子どもの健康」をお読みください。

1期初回  
20日～56日の間隔をおいて3回接種

1期追加  
1期初回3回目の接種後、  
6か月～1年半の間隔をおいて1回接種

令和6年4月から5種混合ワクチンを基本としますが、当面の間4種混合及  
びヒブワクチンを使用することもできます。  
初回から追加接種までは原則同一のワクチンで接種することになります。

標準的には、生後5か月～8か月未満に接種します。

1期  
1歳を過ぎたら早めに接種しましょう。  
小児用肺炎球菌、5種混合、MR、水痘を同時接種で受  
けることもできます。

2期  
幼稚園・保育園の年長児相当の  
年度の4月1日から3月31日まで。  
(小学校就学前の1年間です。)

1回目接種  
1歳～1歳3か月未満までに接種

2回目接種  
1回目接種後、6か月から1年の間隔をおいて接種

1期初回  
3歳～4歳未満までに、6日から  
28日の間隔をおいて2回接種

1期追加  
初回2回目の接種後、  
おおむね1年後に1回接種



標準的な接種期間  
接種可能な期間

◆この表は、乳幼児期(7歳6か月未満)までの定期予防接種の受け方の一例として作成したものです。  
◆それぞれのワクチンは、免疫をつくるため、望ましい接種間隔があります。  
実際の受け方については、接種を希望する医療機関とご相談のうえ、スケジュールを組みましょう。